



ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO DE
SANTA CATARINA

PUC-SP

RESIDÊNCIA MÉDICA 2019

Especialidades com pré-requisito em
CIRURGIA GERAL

O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.

Instruções

- A duração da prova é de 3 horas, devendo o candidato permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora e 30 minutos.
- A prova contém 35 questões objetivas, cada uma com 4 alternativas, das quais apenas uma é correta, e uma questão dissertativa que deve ser respondida nesse caderno.
- Assinale na folha ótica de respostas a alternativa que julgar correta, preenchendo com caneta esferográfica (azul ou preta), com traço forte, dentro do espaço. Evite amassar ou rasurar.
- No preenchimento da folha ótica, preste atenção na sequência numérica das questões.
- Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta assinalada na folha ótica. Também não serão computadas aquelas respostas com emenda ou rasura, ainda que legíveis, assinaladas com traço fraco ou em branco.
- Desligue o celular, similares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e coloque-os no envelope designado para esse fim.
- Não é permitido o uso de relógio, seja digital, de pulso, com calculadores ou outros. Coloque-o no envelope também.
- Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova.
- Ao término da prova o candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o caderno de questões e a folha ótica de respostas.

Boa sorte!

ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL:

404 - Cirurgia do Trauma

400 - Cirurgia Plástica

403 - Cirurgia Vascular

402 - Urologia

• Questão 01 •

Qual dos seguintes antibióticos, administrados sem metronidazol, é adequado para profilaxia, ao realizar uma apendicectomia?

- A) Cefalexina.
- B) Ceftriaxona.
- C) Cefotaxima.
- D) Ampicilina-sulbactam.

• Questão 02 •

Qual é a apresentação mais precoce da síndrome do compartimento muscular?

- A) Paralisia.
- B) Ausência de pulsos.
- C) Palidez.
- D) Dor.

• Questão 03 •

Um homem é admitido com pancreatite aguda. Quais dos seguintes achados estão associados ao pior prognóstico?

- A) Falência transitória de múltiplos órgãos.
- B) Insuficiência persistente de múltiplos órgãos e coleção líquida peri-pancreática.
- C) Insuficiência persistente de múltiplos órgãos e necrose pancreática, contendo bolhas de gás.
- D) Insuficiência persistente de múltiplos órgãos e necrose pancreática.

• Questão 04 •

Qual dos seguintes alternativas seria mais adequada na prevenção de trombose venosa profunda, após cirurgia abdominal, em paciente com menos de 40 anos sem fatores de risco conhecidos?

- A) Varfarina pós-operatória.
- B) Deambulação precoce.
- C) Aspirina no pós-operatório.
- D) Meias de compressão sequencial.

• Questão 05 •

Qual é o melhor momento para administrar um antibiótico para prevenir uma infecção cirúrgica?

- A) 2 a 24 horas antes da cirurgia.
- B) Até 1 hora antes da cirurgia.
- C) Logo depois da incisão.
- D) Durante o procedimento.

• Questão 06 •

Você inseriu um dreno torácico em um paciente com pneumotórax. Três horas depois, você nota que há um enfisema subcutâneo significativo no tórax. Depois de verificar o frasco de drenagem e o local do dreno torácico, qual das seguintes alternativas é contraindicada?

- A) Aplicar um curativo oclusivo no local do dreno torácico.
- B) Inserir um segundo dreno torácico.
- C) Ajustar o dreno torácico e fazer uma radiografia de tórax.
- D) Lavar o dreno com solução salina para verificar a sua permeabilidade.

• Questão 07 •

Uma mulher de 64 anos com câncer de cólon metastático, tratada com quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, é submetida a uma laparotomia e desenvolve uma fístula sete dias após a cirurgia. Qual fator é mais provável para dificultar o fechamento da fístula?

- A) Radiação Anterior.
- B) Febre.
- C) Tipo de câncer.
- D) Idade.

• Questão 08 •

Em um paciente que sofreu uma reação hemolítica aguda, qual das seguintes alternativas é um sinal tardio?

- A) Febre.
- B) Sibilos.
- C) Sangramento generalizado.
- D) Hematúria.

• Questão 09 •

Qual é o padrão de tratamento para o manejo de um abscesso hepático piogênico?

- A) Apenas antibióticos.
- B) Cirurgia aberta e antibióticos.
- C) Laparoscopia e antibióticos.
- D) Drenagem percutânea e antibióticos.

• Questão 10 •

Em qual dos seguintes distúrbios os níveis de antígeno carcinoembrionário (CEA) estão elevados?

- A) Hepatite A.
- B) Colite ulcerativa.
- C) Colecistite aguda.
- D) Diverticulite.

• Questão 11 •

Uma massa testicular é detectada. Qual característica é mais consistente com o fato de ser cancerígena?

- A) Dolorosa.
- B) Dura.
- C) Bilateral.
- D) Eritematosa.

• Questão 12 •

Qual é a causa da maioria das lesões traumáticas no diafragma?

- A) Trauma contuso por acidentes com veículo motorizado.
- B) Trauma contuso por queda.
- C) Trauma penetrante por arma branca.
- D) Trauma penetrante por empalamento.

• Questão 13 •

Um adulto de 37 anos sofre remoção colonoscópica de um pólipó de sigmoide com 3 cm. O patologista diagnostica um carcinoma pouco diferenciado, limitado ao pedúnculo sem invasão linfática ou vascular. Qual é o próximo passo?

- A) Sigmoidectomia.
- B) Observação.
- C) Quimioterapia seguida de cirurgia.
- D) Radioterapia.

• Questão 14 •

Qual opção é menos segura para garantir uma via aérea difícil?

- A) Laringoscopia direta e intubação oral.
- B) Intubação endotraqueal com broncoscopia.
- C) Cricotiroidostomia.
- D) Máscara laríngea.

• Questão 15 •

Qual é a causa mais comum de parafimose?

- A) Infecção.
- B) Trauma.
- C) Anemia falciforme.
- D) Iatrogenia.

• Questão 16 •

Uma mulher de 33 anos apresenta uma dor abdominal vaga. O ultrassom não revela cálculos biliares, mas mostra uma lesão de 2 cm no fígado. Ela está usando pílula anticoncepcional há 3 anos. O que deve ser recomendado?

- A) Biópsia com agulha fina.
- B) Remoção cirúrgica.
- C) Observação com rastreio anual.
- D) Sorologia para hepatite.

• Questão 17 •

Durante a cirurgia para o reparo de uma hérnia inguinal, há lesão do nervo genitofemoral. O que vai acontecer?

- A) Dificuldade na marcha.
- B) Ausência de dor na região retal.
- C) Dor na região anterior da coxa.
- D) Perda dos reflexos no joelho.

• Questão 18 •

Um paciente envolveu-se em um trauma automobilístico com múltiplas lesões faciais e ortopédicas. Ele foi intubado e submetido a vários procedimentos nos últimos dois dias. Na Unidade de Terapia Intensiva, os exames laboratoriais são: TSH 0,4 mU / L, T4 normal e T3 0,5 ng / dL. Selecione o próximo passo:

- A) Iniciar a terapia de reposição da tireoide.
- B) Gamagrafia com I 131.
- C) Manter em observação.
- D) Iniciar dexametasona.

• Questão 19 •

Um paciente com cirrose hepática tem um perfil de coagulação anormal, mas necessita uma apendicectomia urgente. O plasma fresco congelado é administrado para minimizar o sangramento, devido à cirurgia. Quando é o momento ideal para a transfusão?

- A) 24 horas antes da cirurgia.
- B) Quando o paciente está na sala de espera.
- C) Quando o paciente é chamado para a sala de cirurgia.
- D) Quando o paciente está na sala de recuperação.

• Questão 20 •

Qual anticorpo monoclonal é usado no tratamento da doença de Crohn?

- A) Infliximab.
- B) Abciximab.
- C) Ticlopidina.
- D) Muromonab-CD3 (OKT3).

• Questão 21 •

Uma mulher de 55 anos de idade foi internada no hospital há 48 horas, com pancreatite aguda. Ao calcular seu risco de morte, qual dos seguintes valores contribuiria para um pior escore prognóstico?

- A) PaO₂ de 75 mmHg.
- B) Contagem de glóbulos brancos de 13.000 células / mm³.
- C) Cálcio ionizado de 7,5 mg / dL.
- D) 4 L de sequestro de fluidos.

• Questão 22 •

Uma jovem, 22 anos, cai de um prédio de três andares e reclama de dores no pescoço e nas costas. Parece que ela sofreu uma grave lesão na coluna cervical. Qual das seguintes condições é improvável em um paciente com tal lesão?

- A) Tônus anal aumentado.
- B) Priapismo.
- C) Incapacidade de flexionar os braços.
- D) Extremidades frias.

• Questão 23 •

Qual é a alternativa recomendada para o manejo das lesões diafragmáticas?

- A) Todos os ferimentos do lado esquerdo requerem reparo cirúrgico.
- B) Alguns podem curar-se espontaneamente, por segunda intenção.
- C) O reparo requer laparotomia.
- D) A terapia é conservadora, com aspiração nasogástrica apropriada, na maioria dos casos.

• Questão 24 •

Ao rever uma TC abdominal em um homem de 80 anos, com fezes escuras e cansaço, observa-se uma grande massa de tecido mole, que aumenta de maneira heterogênea na parede gástrica, com uma superfície lobulada. São observadas massas adjacentes de tecido mole, ao longo da cápsula do fígado e do ligamento gastrocólico. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) GIST (tumor estromal gastrointestinal).
- B) Linfoma gástrico.
- C) Sarcoma de Kaposi.
- D) Carcinoma gástrico.

• Questão 25 •

Uma mulher de 17 anos de idade é submetida a laparotomia diagnóstica para traumatismo contuso no abdome. Durante a cirurgia, ela recebe 16 unidades de concentrado de hemácias. Na unidade de terapia intensiva, encontra-se sangramento na sonda nasogástrica, na punção venosa e na incisão cirúrgica. Qual das seguintes opções está correta?

- A) A paciente tem um distúrbio de sangramento herdado geneticamente.
- B) O cirurgião não ligou um vaso sangrante.
- C) A coagulopatia é secundária à transfusão maciça de sangue.
- D) A administração de desmopressina é necessária.

• Questão 26 •

Qual é a cirurgia inicial adequada para um paciente hemodinamicamente instável, que apresentou lesão diafragmática e outras lesões em órgão sólido associadas, após um trauma contuso grave?

- A) Laparotomia diagnóstica, reparo primário do diafragma, fechamento do abdome e embolização por radiologia intervencionista dos vasos sangrantes.
- B) Toracotomia e reparo primário do diafragma.
- C) Laparotomia diagnóstica, obtenção de hemostasia e reparo primário do diafragma.
- D) Laparotomia diagnóstica, obtenção de hemostasia e reparo com compressas da lesão diafragmática.

• Questão 27 •

Um retalho TRAM pode não ser uma boa opção para paciente que passou por qual tipo de procedimento no passado?

- A) Abdominoplastia.
- B) Tatuagem do umbigo.
- C) Reparo de hérnia umbilical.
- D) Cesariana.

• Questão 28 •

Um paciente com uma queimadura de III grau em 20% do seu corpo é tratado com cefalosporina. O estagiário da equipe não recomenda iniciar um aminoglicosídeo ao mesmo tempo, pois aumentará o risco de qual das seguintes alternativas?

- A) Reação alérgica.
- B) Nefrotoxicidade.
- C) Sangramento.
- D) Trombocitopenia.

• Questão 29 •

Uma laceração do pescoço, superficial à fáscia cervical profunda, ao longo do músculo esternocleidomastóideo, no seu ponto médio, causará sangramento de qual estrutura?

- A) Artéria carótida externa.
- B) Veia jugular externa.
- C) Veia jugular interna.
- D) Artéria cervical transversa.

• Questão 30 •

Um paciente politraumatizado teve danos significativos nos cólons. Foi operado e iniciou nutrição parenteral total (NPT). No 14º PO, ele foi novamente operado. A nutrição parenteral total foi administrada durante a cirurgia. Apesar de estar bem acordado antes da cirurgia, o paciente permanece em coma na sala de recuperação. Ele não tem febre. Qual a melhor opção de tratamento para este paciente?

- A) Iniciar o gotejamento de insulina.
- B) D50W em bolus.
- C) Administrar Naloxona.
- D) NaCl 0,9% IV.

• Questão 31 •

Um jovem de 17 anos está envolvido em uma colisão automobilística. O exame revela luxação do joelho direito com ausência de pulso poplíteo. Seus sinais vitais são estáveis. Qual é o próximo passo?

- A) Cirurgia para tratar o joelho.
- B) Obter uma angiografia.
- C) Obter um Doppler do membro Inferior D.
- D) Estudar a condução nervosa.

• Questão 32 •

Qual dos seguintes exames é mais usado para diagnosticar pancreatite crônica?

- A) Lipase sérica.
- B) Elastase-1 fecal.
- C) Colangiopancreatografia por ressonância magnética.
- D) Endoscopia digestiva alta.

• Questão 33 •

No trauma, não é uma vantagem da ultrassonografia sobre a tomografia computadorizada (TC):

- A) O ultrassom pode ser feito no paciente hemodinamicamente instável.
- B) O ultrassom tem uma sensibilidade maior que a TC para líquido livre intra-abdominal.
- C) O ultrassom pode ser feito à beira do leito.
- D) O ultrassom pode ser feito de segundos a minutos.

• Questão 34 •

Um adolescente de 17 anos sofre lesão abdominal contusa, após uma colisão com veículo automotor. A radiografia abdominal revela ar ao redor do rim e ele tem crepitação no quadrante inferior direito. Qual é a estrutura mais provavelmente atingida?

- A) Estômago.
- B) Bexiga.
- C) Ducto biliar.
- D) Duodeno.

• Questão 35 •

Uma mulher de 52 anos de idade, aparentemente bem, tem sinais vitais normais e apresenta dor retal nas últimas semanas. Qual exame tem a maior sensibilidade para patologia anorretal?

- A) Colonoscopia por fibra óptica.
- B) Anuscopia.
- C) Enema baritado.
- D) Colonoscopia virtual.



Questão Dissertativa

Você deverá respondê-la no caderno de questões, utilizando as linhas disponíveis. Fique atento ao local destinado.

Caso Clínico:

Um menino de doze anos foi atendido no Pronto Socorro, após envolver-se em uma ocorrência automobilística. Foi informado que o veículo passou sobre ele. Na ausculta havia ausência de murmúrio no hemitórax esquerdo. Apresentava ainda hipotensão (90/50 mmHg) e taquicardia (140 / min). O exame físico revelou dor e hematoma subcutâneo abdominal e instabilidade pélvica. Um cateter uretral foi inserido, revelando hematúria macroscópica. O ultrassom *FAST* era positivo. A radiografia de tórax revelou hemopneumotórax esquerdo e duas fraturas costais. Na radiografia pélvica foi detectada uma fratura do lado esquerdo. O paciente respondeu à reposição volêmica inicial. A tomografia computadorizada confirmou o hemopneumotórax e revelou rotura diafragmática esquerda com herniação renal (Figura 1). Uma laparotomia foi realizada e encontrou-se uma laceração do baço, rutura diafragmática e o rim esquerdo herniado através do diafragma, como visto na tomografia computadorizada. Não havia trauma observável no pedículo renal, mas havia rutura ureteral próxima da bexiga.



Pergunta-se:

A) Em qual momento você faria a drenagem de tórax?

nota

B) Como você faria a reposição volêmica?

nota

Dada a descrição das lesões encontradas na laparotomia:

C) Como você trataria a laceração esplênica?

nota

D) Você faria a nefrectomia esquerda?

nota

E) Como você repararia a lesão diafragmática?

nota

O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.



PUC-SP



ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO DE
SANTA CATARINA



FUNDAÇÃO SÃO PAULO

NucVest
vestibulares e concursos