

Estação conjunta Ginecologia Obstetrícia/ Pediatria/ Clínica Cirúrgica

Examinador: _____
Nome por extenso e legível

Nº	Lista de resposta da prova prática:	Resposta	
		SIM	NÃO
01	Houve algum acidente contaminando o candidato?	0,00	0,50
02	O candidato posicionou a agulha no porta-agulha com a cavidade para cima?	0,50	0,00
03	Usou o porta-agulhas na mão dominante?	0,50	0,00
04	Introduziu o dedo anular e polegar nos anéis?	0,50	0,00
05	Apoiou o indicador e médio nas hastes?	0,50	0,00
06	Segurou a pinça dente de rato como um lápis?	0,50	0,00
07	Entrou com a agulha perpendicularmente na pele?	0,50	0,00
08	Entrou com a agulha na ferida e saiu na pele?	0,50	0,00
09	Enrolou o fio do lado da agulha no porta-agulha duas vezes (1º semi-nó)?	0,50	0,00
10	Procedeu o 2º. semi-nó no sentido contrário?	0,50	0,00
11	Repetiu a operação efetuando o 3º. semi-nó (nó de segurança)?	0,50	0,00
12	Cortou o fio excedente na distância correta?	0,50	0,00
13	Manteve 5 a 10 mm na distância correta, deixando simétrica a sutura?	0,50	0,00
14	Deixou os nós do mesmo lado da ferida?	0,50	0,00
15	Conseguiu dar os três pontos solicitados?	0,50	0,00

Assinatura do Candidato

Estação conjunta Ginecologia Obstetrícia/ Pediatria/ Clínica Cirúrgica

Nº	Lista de resposta das questões de Ginecologia/Obstetrícia:	Resposta	
		SIM	NÃO
01	Escolheu o fio correto? (Catgut-0 simples)	2,00	0,00
02	Escolheu a receita correta? (Receita 3)	2,00	0,00

Nº	Lista de resposta da questão de Pediatria:	Resposta	
		SIM	NÃO
01	Escolheu a alternativa correta? (Conduta C)	2,00	0,00

Nº	Lista de resposta da prática de Cirurgia:	Resposta	
		SIM	NÃO
01	Limpou a pele das bordas da ferida de dentro para fora, fazendo vários círculos que se expandem para fora com solução antisséptica. <i>(Não introduziu um agente de limpeza diretamente na ferida):</i>	1,00	0,00
02	Considerou anestésiar a ferida antes da limpeza e irrigação, porque esses procedimentos podem ser bastante dolorosos:	1,00	0,00
03	Inseriu a agulha diretamente na camada subdérmica exposta da borda da ferida. <i>(não inseriu a agulha por via percutânea)</i> e avançou a agulha até o canhão:	1,00	0,00
04	Aspirou para excluir inserção intravascular e então injetou lentamente o anestésico ao remover a agulha:	1,00	0,00