



RESIDÊNCIA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E ENFERMAGEM EM NEONATOLOGIA PUC-SP • 2024



O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.

Instruções

- A duração da prova é de 2 horas e meia, devendo o candidato permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora e meia.
- A prova contém 40 questões objetivas, cada uma com quatro respostas, das quais apenas uma é correta, sobre temas da área de pré-requisito.
- Assinale na folha ótica de respostas a alternativa que julgar correta, preenchendo com caneta esferográfica (azul ou preta), com traço forte, dentro do espaço. Evite amassar e rasurar.
- Não serão computadas as questões que contenham mais de uma resposta assinalada na folha ótica. Também não serão computadas aquelas respostas com emenda ou rasura, ainda que legíveis, assinaladas com traço fraco ou em branco.
- Desligue o celular, similares e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e coloque-os no envelope designado para este fim.
- Não é permitido o uso de relógio, seja digital, seja analógico, com calculadoras ou outros recursos. Coloque-o no envelope também.
- Será excluído da seleção o candidato que lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova.
- Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o caderno de questões e a folha ótica de respostas.

Boa prova!

• Questão 01 •

Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado em relação à própria saúde e a das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde com base em lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social, são fundamentos e diretrizes da:

- a) Política Nacional de Humanização.
- b) Atenção Primária da Saúde.
- c) Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS.
- d) Atenção Secundária da Saúde.

• Questão 02 •

Diversos problemas ambientais estão associados à falta ou à precariedade do saneamento, tais como:

- a) Gestão das bacias hidrográficas.
- b) Coleta, tratamento e disposição final dos esgotos, resíduos sólidos e gasosos.
- c) Doenças, erosão acelerada, assoreamento, inundações, contaminação da água para abastecimento humano.
- d) Coleta, escoamento e drenagem das águas das chuvas por equipamentos urbanos compostos por redes de drenagem subterrânea e superficial.

• Questão 03 •

Na perspectiva do desenvolvimento no curso de vida, a família passa por diferentes fases, tendo, em cada uma, que realizar tarefas específicas daquela fase como na chegada de uma criança, na adolescência dos filhos, quando os filhos adquirem independência e saem de casa e na reestruturação da relação conjugal.

PORQUE

Existe interconexão entre o desenvolvimento do grupo familiar e o desenvolvimento do indivíduo; é durante os períodos de mudança no desenvolvimento dos indivíduos que novas necessidades e demandas têm que ser integradas ao estilo e ao conjunto de regras da família.

A esse respeito, é possível concluir que:

- a) As duas afirmações são falsas.
- b) As duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
- c) A primeira afirmação é verdadeira, porém a segunda é falsa.
- d) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

• Questão 04 •

Os conceitos de

- I. acolhimento, afetividade e humanização;
- II. construção de conhecimentos de forma participativa e criativa;
- III. relações dialógicas entre profissionais de saúde e população;
- IV. práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

Referem-se, respectivamente, a:

- a) Diálogo, problematização, amorosidade, construção compartilhada de conhecimento.
- b) Amorosidade, problematização, diálogo, construção compartilhada de conhecimento.
- c) Diálogo, construção compartilhada de conhecimento, amorosidade, problematização.
- d) Amorosidade, construção compartilhada de conhecimento, diálogo, problematização.

• Questão 05 •

A comunicação verbal e não verbal forma um conjunto importante na comunicação da área da saúde e são parte do processo de avaliação, tratamento e ações na enfermagem.

- a) A comunicação não verbal se expressa por gestos, expressões faciais, linguagem corporal, aparência física, paralinguagem, proxêmica, contato físico e escrita.
- b) A comunicação não verbal se expressa por gestos, expressões faciais, linguagem corporal, aparência física, paralinguagem, contato físico e escrita.
- c) A comunicação não verbal se expressa por gestos, expressões faciais, linguagem corporal, aparência física, proxêmica, contato físico e escrita.
- d) A comunicação não verbal se expressa por gestos, expressões faciais, linguagem corporal, aparência física, paralinguagem, proxêmica, e contato físico.

• Questão 06 •

Conforme cita esta Ficha Informativa do Ministério da Saúde (novembro 2008), o acolhimento deve estar presente em todas as interações entre paciente, acompanhante e profissionais de saúde, lembrando que:

- a) *“O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do familiar em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes.”*
- b) *“O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes.”*
- c) *“O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta passiva do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes.”*
- d) *“O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas dores, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes.”*

• Questão 07 •

As práticas de educação em saúde envolvem os atores prioritários:

- a) Profissionais de saúde que valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto às práticas curativas; gestores que apoiem esses profissionais.
 - b) População que necessita construir seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente.
 - c) Profissionais, gestores e população acima mencionados.
 - d) Outros atores além dos mencionados são prioritários.
-

• Questão 08 •

A escola de enfermagem Ana Neri é considerada um marco na Enfermagem brasileira porque:

- a) Privilegiou a formação de enfermeiras voltada para a saúde pública visando atender a população atingida pelas epidemias do início do século.
 - b) Sua primeira turma fundou a Associação Brasileira de Enfermagem, que criou a revista Brasileira de Enfermagem.
 - c) Promoveu a unificação dos trabalhadores na área de enfermagem no país desde o período pós-República, quando havia apenas religiosos em todos os hospitais da época.
 - d) Contou com a colaboração de médicos norte-americanos, por meio da Fundação Rockefeller que trouxeram o modelo norte-americano de assistência à saúde para o Brasil.
-

• Questão 09 •

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é responsabilidade do profissional de enfermagem em relação ao sigilo das informações dos pacientes:

- a) Compartilhar as informações apenas com a equipe médica.
 - b) Divulgar informações apenas aos familiares próximos do paciente.
 - c) Respeitar o sigilo das informações em todas as situações, salvo quando autorizado ou exigido por lei.
 - d) Utilizar as informações dos pacientes para fins pessoais, desde que não prejudique o paciente.
-

• Questão 10 •

Em relação a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) pode-se afirmar:

- a) A realização do diagnóstico de enfermagem exige que a coleta de dados de enfermagem, compreendida como exame físico, ocorra de forma sistematizada.
- b) A prescrição de enfermagem se caracteriza nos cuidados a serem prestados pela equipe de enfermagem.
- c) A implementação da SAE impõe aos enfermeiros decidir de maneira metódica e científica na atuação de toda a equipe de enfermagem.
- d) Compete ao enfermeiro elaborar a evolução de enfermagem que também se compõe das anotações de enfermagem realizadas por sua equipe.

• Questão 11 •

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi elaborada em 2004, a partir de diagnóstico epidemiológico da situação da saúde da mulher no Brasil e do reconhecimento da importância de se contar com diretrizes que orientassem as políticas de Saúde da Mulher. A PNAISM teve como base o Programa de Atenção Integral de Saúde da Mulher (PAISM), elaborado em 1983, no contexto da redemocratização do país/ Conferência de Alma-Ata (1978) e com a participação dos movimentos sociais e de mulheres, em especial o movimento feminista (BRASIL, 2009). De acordo com a PNAISM, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

() A elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher deve considerar a perspectiva de gênero, de raça e de etnia, rompendo-se as fronteiras da saúde sexual e da saúde reprodutiva, para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher.

() Os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos foram consolidados com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual, excluindo apenas a atenção às condições crônicas não reprodutivas.

() As ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas, foram consolidados como as mulheres lésbicas, bissexuais, no climatério, as mulheres do campo e da floresta, as índias, as negras quilombolas, as que vivenciam a transexualidade, mulheres em situação de prisão, portadoras de deficiência, em situação de rua e as ciganas.

A alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- a) F, V, V. b) V, F, F. c) V, V, F. d) V, F, V.

• Questão 12 •

A Rede Cegonha foi instituída pela Portaria nº 1.459/ GM/MS, 24 de junho de 2011. Sobre a Rede Cegonha, é **correto** afirmar que:

- a) A Rede Cegonha, consiste em uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher a atenção humanizada à gravidez. O parto, o puerpério e a criança não são de responsabilidades dessa rede.
- b) A Rede Cegonha tem como princípios a universalidade, a integralidade e a participação social.
- c) A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro componentes: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico (transporte, sanitário e regulação).
- d) A Rede Cegonha deve ser implementada, rapidamente, em todo território nacional considerando critérios epidemiológicos.

• Questão 13 •

Quanto a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), assinale a opção **INCORRETA**.

- a) A participação igualitária de homens e mulheres no planejamento familiar é importante para o desenvolvimento e co-responsabilidade, independente do estado civil.
- b) Os métodos contraceptivos devem respeitar os seguintes aspectos: eficácia, aceitabilidade, disponibilidade, facilidade de uso e reversibilidade.
- c) O teste imunológico para a gravidez detecta a gonadotrofina coriônica excretada pela urina da gestante, importante no diagnóstico da gravidez.
- d) No puerpério, a involução uterina em mulheres amamentando ocorre mais lentamente devido ao estímulo de sucção.

• Questão 14 •

O déficit hídrico no organismo humano provoca alterações que podem ser percebidas pelo exame físico. É **correto** afirmar que nessa situação:

- a) A pele torna-se mais ressecada, com pouca lubrificação.
 - b) O exame da língua é um dos bons indicadores.
 - c) Ocorre aumento do turgor e diminuição do brilho dos olhos.
 - d) A pele torna-se descamativa em situação crítica.
-

• Questão 15 •

Quando o indivíduo passa de decúbito dorsal para a posição ortostática ocorre acúmulo de um volume significativo de sangue nos MMII. Isso se deve ao:

- a) Aumento da pressão arterial e redução do débito cardíaco.
 - b) Aumento do volume sistólico e redução do débito cardíaco.
 - c) Elevada complacência das veias.
 - d) Aumento dos disparos simpáticos do seio carotídeo.
-

• Questão 16 •

Considera-se bulha hiperfonética na ausculta cardíaca quando:

- a) Em foco mitral a segunda bulha é mais intensa que a primeira bulha.
 - b) Em foco aórtico, a segunda bulha é mais intensa e audível que a primeira.
 - c) Em foco tricúspide a primeira bulha é mais intensa do que deveria ser.
 - d) Em foco pulmonar a segunda bulha é mais audível que a primeira.
-


• Questão 17 •

É **correto** afirmar que:

- a) a termorregulação é feita pela região pré-óptica do hipotálamo, hipófise e suprarrenais.
- b) a vasoconstrição é uma das consequências da resposta do organismo ao aumento do volume de sangue na periferia, durante os banhos gelados.
- c) existe uma relação indireta entre a volemia e o débito cardíaco.
- d) a taxa de cortisol está mais alta no período da manhã e da melatonina à noite.

• Questão 18 •

No gráfico abaixo, aponte a sequência **correta** dos eventos correspondentes a numeração 1, 2 e 3.



- a) Sístole, sístole, sístole.
- b) Sístole, diástole, sístole.
- c) Diástole, sístole, diástole.
- d) Diástole, diástole, diástole.

• Questão 19 •

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem (PE) são aplicados para que a oferta e realização dos cuidados de enfermagem sejam feitas com fundamentação teórica e técnica-científica e, por conseguinte, com qualidade. Sobre a SAE e o PE, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir.

- I. Na etapa do diagnóstico de enfermagem faz-se a interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa do PE.
- II. A aplicação do processo de enfermagem como instrumento metodológico está prevista no capítulo que trata dos direitos dos profissionais no Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- III. A etapa de coleta de dados e a do diagnóstico de enfermagem podem ser feitas pelo técnico de enfermagem, desde que seja treinado para tal, mas a prescrição de enfermagem é privativa da(o) enfermeira(o).

As afirmativas I, II e III são, respectivamente:

- a) V, F, V.
- b) V, V, F.
- c) F, V, F.
- d) V, F, F.

• Questão 20 •

O Caderno de Atenção Básica “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus” (BRASIL, 2013), recomenda o revezamento sistemático dos locais de aplicação da insulina de modo a manter uma distância mínima de 1,5 cm entre cada injeção, bem como evitar a reaplicação no mesmo local em menos de 15 a 20 dias, para prevenir a ocorrência de:

- a) Cetoacidose.
- b) Lipodistrofia.
- c) Complicações macrovasculares.
- d) Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica.

• Questão 21 •

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, mas que pode, também, acometer outros órgãos e sistemas. Embora seja uma doença passível de prevenção e cura, ainda representa um grave Problema de Saúde Pública no Brasil e em diversos países, estando relacionada a condições de pobreza e desigualdade social (BRASIL, 2019). Em relação à Tuberculose, é **correto** afirmar que:

- a) A infecção prévia causada pelo bacilo *M. tuberculosis* evita o adoecimento, conferindo imunidade e impedindo que recidivas possam ocorrer.
- b) Atualmente, o Brasil possui uma epidemia generalizada de TB concentrada, sobretudo, em populações específicas como as pessoas vivendo em situação de rua.
- c) A transmissão da TB se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis, produzidos pela tosse ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea.
- d) A distribuição do número de casos de TB ocorre de forma igual no mundo e, por isso, a transmissão e o adoecimento não têm relação com fatores sociais ou demográficos.

• Questão 22 •

O enfermeiro, ao avaliar um idoso com diagnóstico clínico provável de infarto agudo do miocárdio, deve considerar os sintomas atípicos. Principalmente, no idoso, a ausência de:

- a) Palidez.
- b) Arritmias.
- c) Sudorese.
- d) Dor.

• Questão 23 •

O AVE (Acidente Vascular Encefálico) é uma lesão que afeta o neurônio motor superior, resultando em perda do controle voluntário sobre os movimentos motores.

I. Como os neurônios motores superiores sofrem decussação (cruzamento), a ocorrência de um distúrbio do controle motor voluntário em um lado do corpo pode refletir a lesão aos neurônios motores superiores no mesmo lado do encéfalo.

II. A disfunção motora mais comum é a hemiplegia (paralisia de um lado do corpo ou de parte dele) causada por lesão no lado semelhante do encéfalo.

III. A hemiparesia ou fraqueza de um lado do corpo ou de parte dele constitui outro sinal.

IV. No estágio inicial do AVE, as manifestações clínicas iniciais podem consistir em paralisia flácida e perda, diminuição ou aumento dos reflexos tendinosos.

V. Quando esses reflexos profundos reaparecem (habitualmente em 48 h), observa-se um aumento do tônus, juntamente com espasticidade (aumento anormal do tônus muscular) dos membros no lado afetado.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas III e V estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Apenas I, III e IV estão corretas.

• Questão 24 •

Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas nos garantem uma imunização:

- a) Passiva.
- b) Imediata.
- c) Prolongada.
- d) Ativa.

• Questão 25 •

Rede de frios é o sistema de conservação das vacinas ou imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Engloba a produção até a administração dos mesmos, com o armazenamento, transporte e a manipulação destes produtos em condições adequadas de refrigeração. Em relação aos cuidados que devem ser adotados com a câmara refrigerada na sala de vacinação, é **correto** afirmar que:

- a) Deve ser instalada em local ventilado, caso não seja possível, manter a temperatura do ar condicionado da sala de vacinação entre 19 °C a 20 °C para que não ocorra o aquecimento do refrigerador.
- b) Nas unidades de saúde com pouca demanda de vacinas, a câmara refrigerada pode ser substituída por refrigerador de uso doméstico desde que mantenha a refrigeração ideal entre +2 °C e +7 °C.
- c) A leitura da temperatura deve ser feita apenas no início do turno de trabalho, pela manhã. A temperatura é lida e registrada em formulário, fixado na porta ou na face lateral da câmara refrigerada.
- d) A manutenção da temperatura das câmaras refrigeradas devem ser mantidas entre +2 °C e +8 °C, sendo a temperatura de controle *set point* +5 °C.

• Questão 26 •

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (Ministério da Saúde, 2023), o esquema da vacina papilomavírus humano (HPV) compreende:

- a) Duas doses, com intervalo de 6 (seis) meses entre as doses, de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias para meninas e meninos.
- b) Duas doses, com intervalo de 6 (seis) meses entre as doses, para meninas de 9 a 14 anos de idade e para meninos de 12 a 14 anos de idade.
- c) Três doses, com intervalo de 1 (um) mês e 6 (seis) meses da primeira dose, para meninas de 9 a 14 anos de idade e para meninos de 12 a 14 anos de idade.
- d) Três doses, com intervalo de 1 (um) mês e 6 (seis) meses da primeira dose, de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias para meninas e meninos.

• Questão 27 •

Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa, entre os idosos com 80 anos ou mais, é que 40% sofram quedas todos os anos. Dos que moram em instituições de longa permanência, asilos ou casas de repouso, a frequência de quedas é ainda maior. Destes, 50% podem cair. Nesse contexto é **correto** afirmar:

- a) No geral há mais registros de quedas em homens do que nas mulheres, embora, ambos tendem a ter uma performance boa de equilíbrio, porém possuem uma privação de informação sensorial, ou estas informações são confusas; desta forma, a seleção de pistas sensoriais são boas estratégias para evitar a queda em pacientes idosos.
- b) A etiologia das quedas entre idosos é multifatorial, sendo resultado de uma interação entre fatores intrínsecos, decorrentes das alterações fisiológicas do próprio processo de envelhecimento e das patologias múltiplas associadas, além de fatores extrínsecos, comportamentais.
- c) É fato que as quedas não possuem uma relação com o ambiente em que o idoso vive, tão pouco fatos como hábitos rotineiros em suas AVDs, as condições da temperatura do ambiente e o julgamento errado sobre o uso deste ambiente em favor da qualidade de vida do idoso.
- d) As quedas são causadas apenas por fatores intrínsecos, fazendo com que as medidas preventivas em mudanças do ambiente em que o idoso vive, deixando-o mais seguro e, assim, fazendo com que o mesmo se sinta mais confortável em seu ambiente natural.

• Questão 28 •

Paciente idoso, 65 anos, admitido em serviço de emergência com queixa súbita de fraqueza muscular de um lado do corpo, confusão mental e disfasia há cerca de 2 horas, foi avaliado pelo médico e encaminhado para tomografia de crânio, com resultado compatível de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi), sendo indicado ao tratamento trombolítico intravenoso. Dentre os cuidados apresentados, qual conduta é **contraindicada** para esse paciente?

- a) Suplementar O₂ para manter saturação de oxigênio maior ou igual 95%.
- b) Realizar sonda vesical de demora nos primeiros 30 minutos para controle do débito urinário.
- c) Monitoramento cardiovascular e pressórico não invasivo contínuo, pelo menos nas primeiras 24 horas.
- d) Realizar medidas para evitar hipertermia.

• Questão 29 •

O Sr. Luiz, 68 anos, vem à consulta de enfermagem acompanhado de sua filha que está preocupada com o controle da pressão arterial do pai porque os medicamentos causam alguns efeitos indesejáveis. Isso faz com que o Sr. Luiz nem sempre tome os remédios corretamente. Ele faz uso de captopril 25 mg 2X/d e Hidroclorotiazida (HCTZ) 1X/d pela manhã. Ao exame físico, apresenta IMC de 31,6 Kg/m², PA = 148x94 mmHg. Sobre os efeitos adversos desses fármacos podemos afirmar que:

- a) O primeiro pode causar tosse produtiva e alteração de paladar; o segundo pequeno aumento da frequência as micções, hipopotassemia e hipoglicemia.
- b) O primeiro pode causar tosse seca e alteração de paladar; o segundo grande aumento da frequência as micções, hipopotassemia e intolerância a glicose.
- c) O primeiro pode causar tosse seca e alteração de paladar; o segundo pequeno aumento da frequência as micções, hipopotassemia e intolerância a glicose.
- d) O primeiro pode causar tosse produtiva e alteração de paladar; o segundo grande aumento da frequência as micções, hipopotassemia e hipoglicemia.

• Questão 30 •

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica que deve ser diagnosticada o quanto antes para que o tratamento seja implementado e, portanto, que os riscos de agravos e complicações em órgãos como rins e cérebro sejam diminuídos. Para um diagnóstico correto e cuidados adequados, a verificação da pressão arterial deve ser feita com técnica-procedimental rigorosa. Considerando o atendimento de uma pessoa adulta, assinale a afirmativa **correta** em relação ao procedimento.

- I. O manguito deve ser colocado sem deixar folgas, entre 3 a 5 cm acima da fossa cubital.
- II. A campânula do estetoscópio deve ser posta na artéria cubital que se localiza na fossa braquial.
- III. Deve-se colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da artéria radial e centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria radial.
- IV. Para a correta verificação da pressão, o braço deve estar abaixo da altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotear o membro.
- V. Antes da aferição deve-se certificar se o paciente está com a bexiga vazia, não praticou exercícios físicos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou fumou próximo ao momento da aferição.
- VI. O valor a pressão diastólica deve ser medido pela ausculta do primeiro som identificado no estetoscópio.

- a) Somente estão corretas as alternativas: II, IV e V.
- b) Somente estão corretas as alternativas: I, III e VI.
- c) Somente estão corretas as alternativas: II, V e VI.
- d) Somente estão corretas as alternativas: I e V.

• Questão 31 •

O paciente diabético dependente de insulina, com o passar dos anos, pode apresentar complicações próprias da doença, dentre elas a neuropatia periférica. Nesse contexto, o cuidado com os pés deve ser intensificado e valorizado pelos profissionais da saúde. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

- I. A neuropatia diabética é de fácil controle, principalmente se o portador fizer uso regular de insulina.
- II. Cuidados diários com os pés são determinantes para diagnóstico precoce de lesões para tratamento.
- III. É indicado o uso de pomadas para ajudar no tratamento de calosidades, feridas e lesões nos pés de diabéticos.
- IV. Cortar as unhas de maneira regular deve ser uma das orientações oferecidas aos diabéticos pela equipe de enfermagem.

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

• Questão 32 •

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde ressalta o importante papel do enfermeiro no manejo dessas infecções. Em relação à sífilis, que é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na sífilis latente o diagnóstico é realizado exclusivamente por meio de testes imunológicos, pois não se observam sinais e sintomas clínicos.
- II. Na sífilis primária, após o contato sexual, a primeira manifestação é caracterizada por uma úlcera no local de entrada da bactéria, geralmente indolor acompanhada de linfonodos regionais. Pode desaparecer espontaneamente.
- III. Recomenda-se iniciar a investigação por um teste treponêmico, de preferência o teste rápido, devido à sua maior sensibilidade.
- IV. Após diagnóstico da sífilis e início do seu tratamento, o monitoramento do tratamento é por meio dos testes não treponêmicos.
- V. Pessoas que não sabem informar a existência de reação alérgica ao uso penicilinas não devem ser tratadas com benzilpenicilina benzatina.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Estão corretas as afirmativas I, II e III somente.
- b) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV somente.
- c) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V somente.
- d) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V somente.

• Questão 33 •

Para que ocorra cicatrização é preciso observar a viabilidade do tecido, a presença de infecção ou inflamação, a umidade e a epitelização. Assim, está **correto** o que se afirmar em:

- I. O leito da ferida ressecado ocasiona uma migração lenta das células epiteliais e o excesso de exsudato provoca maceração da margem e da pele perilesional.
- II. Para a epitelização é necessário a migração de queratinócitos, formação da matriz extracelular e neovascularização. Para que ocorra o processo de cicatrização por completo faz-se necessário o uso de terapias corretivas, que poderá ser desbridamento do tecido morto, enxerto de pele no local, uso de agentes biológicos e terapias adjuntas.
- III. Na presença de infecção ou inflamação o tecido apresenta-se com número elevado de citocinas inflamatórias, atividade das proteases e baixa atividade dos fatores de crescimento prejudicando a cicatrização.

- a) I, II, IV.
- b) I, II, III.
- c) II, III, IV.
- d) I, III, IV.

• Questão 34 •

Um paciente está internado devido a uma infecção que está sendo tratada com penicilina. Foi prescrito Penicilina Cristalina 1.500.000 UI em SF 0,9% 100 mL EV de 4/4 horas. Dispõe-se de frasco ampola (FA) de Penicilina Cristalina de 5.000.000 UI e ampola de água destilada de 10 mL. A quantidade a ser aspirada do FA será de:

- a) 6,3 mL.
- b) 3,6 mL.
- c) 5,0 mL.
- d) 3,0 mL.

• Questão 35 •

Homem, 18 anos, vítima de acidente automobilístico com trauma em região tóraco-abdominal, foi internado na clínica cirúrgica em pós-operatório imediato de laparotomia exploradora com correção de trânsito intestinal. Encontra-se com sonda nasogástrica aberta, dreno torácico à direita, sonda vesical de demora e colostomia. Em relação ao caso apresentado, indique a alternativa **INCORRETA**.

- a) A colostomia é uma abertura cirúrgica na parede abdominal para comunicar uma porção do intestino com o exterior, com a finalidade de eliminação de fezes.
- b) Para o registro do débito do dreno torácico, deve-se calcular a diferença entre o volume total desprezado e o volume do selo d'água.
- c) A bolsa coletora da sonda vesical de demora deve ser mantida na altura da linha hemiaxilar para assegurar a drenagem.
- d) A sonda nasogástrica, enquanto mantida aberta, tem como objetivo descomprimir o estômago, removendo líquidos e gases.

• Questão 36 •

Uma gestante dá entrada na sala de admissão da maternidade informando que vai insistir em trabalho de parto normal, assim como sua mãe e avós. Após um trabalho de parto de 15 horas, nasce de parto vaginal um recém-nascido a termo, em boas condições de vitalidade, com peso de 3.800 g. Ao exame físico na sala de parto, apresenta abaulamento no couro cabeludo de consistência líquida localizada na região parietal direita, não depressível e restrita aos limites do osso. A mãe também observa o abaulamento e, preocupada, lhe pergunta o que deve ser. A resposta mais adequada para o caso descrito está expressa na seguinte alternativa:

- a) Deve ser um cefalematoma por deformidade no crânio no canal de parto, mas será necessária uma radiografia de crânio para confirmar.
- b) Não há motivo para preocupação, pois deve ser uma bossa serossanguinolenta, mas que deverá ser realizada uma ultrassonografia transfontanelar para confirmação.
- c) Trata-se de uma bossa serossanguinolenta que é um tumor de partes moles na área da apresentação e que não necessita de acompanhamento, regredindo em poucos dias de vida.
- d) Trata-se de um cefalematoma, decorrente de tocotraumatismo, que deverá ser acompanhado, mas que raramente necessita de alguma intervenção terapêutica.

• Questão 37 •

As intercorrências no aleitamento materno exclusivo são comuns e geralmente são corrigidas e apresentam melhoras com orientações sobre o manejo deste processo. Sobre este tema e orientações acerca de dor nos mamilos/mamilos machucados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A orientação sobre posicionamento adequado e pega correta é a melhor intervenção para dor nos mamilos.
- b) Limitar a duração das mamadas, com utilização de substâncias tóxicas, atua no efeito preventivo e no tratamento do trauma mamilar.
- c) A utilização de protetores mamilares é na prevenção de traumas.
- d) Fazer ordenha antes da mamada não apresenta eficácia no estímulo de controlar a dor no mamilo fissurado.

• Questão 38 •

As crianças são vulneráveis a diferentes tipos de violações, como a física, psicológica, sexual, institucional, estrutural, intrafamiliar e moral, além da negligência, do trabalho infantil e da negação de direitos. A gravidez em meninas menores de 14 anos é considerada crime, pois, na maior parte dos casos, é resultado de violência sexual. No Brasil, de acordo com o Sistema de Informações Hospitalares, no ano de 2020, foram registrados 86 abortos por razões médicas em meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Em 2021, até o mês de setembro, foram registrados 102 abortos semelhantes. (Aborto legal na infância: o discurso oficial e a realidade de um caso brasileiro Fornari LF, Egry EY, Menegatti MS, Sakata So KN, Fonseca RMGS, Oliveira MAC)

Diante desses dados e quando a gestação é secundária a violência sexual analise as assertivas abaixo:

- I. Devido a carência da educação sexual, as adolescentes grávidas vítimas de estupro chegam tardiamente aos serviços de saúde.
- II. A maioria das adolescentes desconhece seus direitos relativos ao aborto legal proveniente do estupro.
- III. As leis brasileiras proíbem o profissional da saúde fazer aborto.
- IV. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o profissional de saúde deve chamar a polícia, quando houver identificar violência sexual.

Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) I e II estão incorretas. b) III apenas. c) IV e II estão incorretas. d) III e IV estão incorretas.

• Questão 39 •

Qual é a estratégia mais eficaz para prevenir erros de medicação relacionados a Medicamentos de Alta Vigilância (MAV) e medicamentos com nomes semelhantes?

- a) Delegar a administração de MAV apenas aos enfermeiros experientes.
- b) Reduzir a disponibilidade de MAV nas unidades de saúde para evitar erros.
- c) Implementar a dupla verificação, etiquetagem adequada, educação da equipe e uso de sistemas de apoio à decisão.
- d) Rotular todos os medicamentos como "perigosos" para aumentar a conscientização da equipe.

• Questão 40 •

A hiperglicemia é caracterizada pela presença de níveis elevados de glicose no sangue, podendo ser causada pela falta de insulina. Escolha a alternativa **correta**, para os principais sinais e sintomas apresentados por diabéticos com este quadro.

- a) Polaciúria, fadiga e falta de apetite.
- b) Poliúria, excesso de fome e polidipsia.
- c) Disúria, ganho de peso e polidipsia.
- d) Tontura, polidipsia e fadiga.

O conteúdo desta prova é de propriedade da Fundação São Paulo. É expressamente proibida a sua reprodução, utilização em outros concursos, bem como o uso em sala de aula ou qualquer outro tipo, na totalidade ou em parte, sem a prévia autorização por escrito, estando o infrator sujeito à responsabilidade civil e penal.



PUC-SP



FUNDAÇÃO SÃO PAULO

NucVest
vestibulares e concursos

www.nucvest.com.br